



# 112 年彰化與雲林地區地層下陷監測及分析

## Monitoring and Analyzing Land Subsidence of Changhua and Yunlin Area in 2023

7 月份工作月報  
(6 月份工作成果)



主辦機關：經濟部水利署

執行單位：詮華國土測繪有限公司

計畫主持人：陳俊德

中華民國 112 年 7 月 10 日

## 目錄

壹、	綜合說明.....	1
貳、	監測資料.....	1
一、	深層水準樁及 GNSS 固定站之資料分析.....	1
二、	雷達干涉資料處理與分析.....	6

## 壹、綜合說明

各項監測設施包含深層水準樁、地下水位站及 GNSS 之觀測成果請參考第貳節說明。本月份深層樁觀測之地層變化：多數站為回脹，僅溪州國小站為下陷。觀察 111/4~112/6 與前一年度同期（110/4~111/6），各站下陷趨勢皆增加。

## 貳、監測資料

### 一、深層水準樁及 GNSS 固定站之資料分析

- (一) 今年 6 月彰化及雲林地區深層水準樁單月變化量：多數站為回脹，僅溪州國小站為下陷。回脹量最大之測站為土庫國中 300m，本月回脹量為 4.1 公釐。整體回脹量較去年 6 月減少。
- (二) 由深層水準樁觀測成果（表 3）顯示，111 年 4 月~112 年 6 月最大累積變化量位於土庫國中 400m 深層樁，累積下陷量達 44.8 公釐，其次為土庫國中 300m 深層樁，累積下陷量達 32.5 公釐；而與過去同期（110 年 4 月~111 年 6 月）相比，各站長期下陷趨勢皆為增加。
- (三) 由各深層水準樁與地下水觀測井及 GNSS 測站之觀測比較成果顯示（圖 3~圖 6），深層水準樁與其他監測設施之變形趨勢大致相同，於地下水位回升時，下陷趨勢相對減緩，而地下水位下降時，下陷趨勢相對增加。
- (四) 表 3 中單月變化量取當月月平均減前月月平均計算而得；累積變化量則以 4 月份月平均為基準，計算各月份月平均與基準值之差距。
- (五) GNSS、地下水位、深層水準樁取每月平均值加以計算，以 111 年 4 月為基準點呈現於圖表中。GNSS 資料因使用精密星曆故資料解算需延後一個月。
- (六) GNSS 資料接收狀況：整月份缺失(○)、有連續資料(●)、有資料但當月有多日缺失(▲)。

表 1 GNSS 資料接收概況表

GNSS 站	站代碼	5 月	GNSS 站	站代碼	5 月
溪州國小	SJES	●	客厝國小	KTES	●
土庫國中	TKJS	●	林內國中	LNJS	▲
秀潭國小	STES	●	龍巖國小	LYES	●
中科虎尾	NTUH	●	明德國小	MDES	▲
安南國小	ANES	▲	南光國小	NGES	●
西港國小	CHSG	▲	仁和國小	RHES	●
豐榮國小	FRES	▲	水燦林國小	SLES	●
光復國小	GFES	●	山內國小	SNES	●
宏崙國小	HLES	●	新生國小	SSES	○
湖南國小	HNES	●	元長國小	YCES	●
舊庄國小	JJES	●	新興國小	YSSL	○
拯民國小	JMES	●	宜梧國中	YWJS	●
忠孝國小	JSES	●			

表 2 彰雲地區深層水準樁 112 年 6 月觀測成果

編號	縣市	站名	設置深度(m)	單月下陷量(mm)			累積下陷量(mm)		
				111/6	112/6	趨勢	110/4~111/6	111/4~112/6	趨勢
1	彰化	溪州國小	300	-0.2	0.3	↘	8.4	14.0	↘
2	雲林	土庫國中	130	-6.0	-3.3	↘	3.0	14.2	↘
3		土庫國中	300	-7.5	-4.1	↘	11.3	32.5	↘
4		土庫國中	400	-6.4	-2.3	↘	26.7	44.8	↘
5		秀潭國小	70	-6.7	-2.0	↘	11.3	15.3	↘
6		中科虎尾	70	-1.3	-1.4	↗	0.4	4.1	↘
7		中科虎尾	300	-1.7	-0.1	↘	24.6	33.6	↘

註：1. 表中數值以正值代表壓縮，負值代表回脹

2. 箭頭表示與前一年度同期相比之壓縮變化趨勢；「↘」表下陷趨勢增加，「↗」表下陷趨勢減緩。

溪州國小




圖 1 彰化縣溪州國小 111/4~112/6 監測成果圖

註：溪州國小 1 月份 GNSS 資料缺失。

### 土庫國中




圖 2 雲林縣土庫國中 111/4~112/6 監測成果圖

### 秀潭國小




圖 3 雲林縣秀潭國小 111/4~112/6 監測成果圖




圖 4 雲林縣中科虎尾園區 111/4~112/6 監測成果圖

## 二、雷達干涉資料處理與分析

111年4月至112年5月彰化InSAR下陷成果，如圖 5所示。

### ■ 埔鹽(扇央)

1. 最大下陷量為4.2 cm/yr，位於埔鹽國小南方約900 m處

### ■ 溪湖(扇央)

1. 最大下陷量為4.5 cm/yr，位於湖南國小西南方約2700 m處

### ■ 埤頭(扇央)

1. 最大下陷量為4.7 cm/yr，位於埤頭國中東南方約1400 m處

### ■ 二林(扇央)

1. 最大下陷量為5.4 cm/yr，位於原斗國小東北方約3400 m處

### ■ 溪州(扇央)

1. 最大下陷量為 4.6 cm/yr，位於僑義國小西北方約 1200 m 處

### ■ 竹塘(扇央)

1. 最大下陷量為 3.4 cm/yr，位於長安國小西南方約 1300 m 處

### ■ 鹿港(扇尾)

1. 最大下陷量為3.7 cm/yr，位於彰濱工業區內




圖 5 111 年 4 月至 112 年 5 月彰化地區 InSAR 下陷成果圖

註：正值代表下陷，負值代表回脹

111年4月至112年5月雲林InSAR下陷成果，如圖 6所示。

■ 二崙(扇央)

1. 最大下陷量為4.2 cm/yr，位於三和國小西南方約2350 m處

■ 崙背(扇央、扇尾)

1. 最大下陷量為4.3 cm/yr，位於東興國小東南方約1700 m處

■ 虎尾(扇央)

1. 最大下陷量為7.1 cm/yr，位於中科虎尾園區內

■ 土庫(扇央)

1. 最大下陷量為6.8 cm/yr，位於秀潭國小東南方約1450 m處

■ 褒忠(扇央、扇尾)

1. 最大下陷量為5.3 cm/yr，位於龍巖國小東北方約2350 m處

■ 元長(扇央)

1. 最大下陷量為7.5 cm/yr，位於客厝國小西北方約1400 m處

■ 大埤(扇央)

1. 最大下陷量為6.6 cm/yr，位於舊庄國小西方約1650 m處

■ 北港(扇央、扇尾)

1. 最大下陷量為5.8 cm/yr，位於東榮國小東北方約1000 m處

■ 麥寮(扇尾)

1. 最大下陷量為3.4 cm/yr，位於麥寮工業區內

■ 臺西(扇尾)

1. 最大下陷量為2.6 cm/yr，位於臺西國中西北方約3700 m處

■ 東勢(扇尾)

1. 最大下陷量為4.6 cm/yr，位於明倫國小東北方約600 m處

■ 四湖(扇尾)

1. 最大下陷量為4.2 cm/yr，位於東光國小東南方約2150 m處

■ 水林(扇尾)

1. 最大下陷量為4.8 cm/yr，位於水燦林國小西北方約3550 m處




圖 6 111 年 4 月至 112 年 5 月雲林地區 InSAR 下陷成果圖

註：正值代表下陷，負值代表回脹